

2025 Miljöhälsorapport

Nationell utblick



Nationell utblick

Denna bilaga har tagits fram som ett komplement till Miljöhälsorapport Stockholms län 2025. Resultaten som presenteras här syftar till att belysa skillnader och likheter om miljörelaterade exponeringar och besvär mellan olika regioner i Sverige. Jämförelserna har i huvudsak gjorts mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

Resultat från miljöhälsoenkäterna finns också publicerade i en databas på Folkhälsomyndighetens webbplats kallad "Folkhälsodata". Där presenteras prevalenser för alla enkätfrågor, med samtliga svarsalternativ separat. https://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/A_Folkhalsodata/A_Folkhalsodata/

Resultaten som presenteras i denna bilaga, "nationella utblick", har tagits fram för att göra det möjligt att jämföra några av de resultat som bygger på kombinationer av flera variabler eller svarsalternativ på regional och nationell nivå. I "nationell utblick" har vi också använt oss av andra regionala indelningar än vad som finns i Folkhälsodata

Innehållsförteckning

Nationell utblick..... 2

Miljöhälsoenkät 2023 (MHE23)..... 4

Luftföroreningar 5

Buller..... 11

Inomhusmiljö..... 16

Klimatförändringar 19

Naturmiljöer, urbanisering och fysisk aktivitet..... 22

UV-strålning..... 23

Kemikalier..... 25

Miljötabaksrök 29

Allergi och sjukdomar i luftvägarna 33

Jämlik miljöhälsa..... 35

Miljöhälsoenkät 2023 (MHE23)

Tabell 1. Miljöhälsoenkät 2023. Information om antal skickade och besvarade enkäter samt svarsfrekvens och målbefolkningen. Jämförelse mellan olika områden

	Antal skickade enkäter	Antal besvarade enkäter	Svarsfrekvens*	Målbefolkning**
Stockholms län	125 924	46 282	36,8	1 762 891
Västra Götaland	12 840	4 927	38,8	1 293 823
Skåne	12 751	4 560	36,0	1 028 813
Övriga Sverige	84 385	32 956	39,1	3 663 363
Sverige	235 900	88 725	38,0	7 748 889

Enkätens målgrupp bestod av alla som bodde i Sverige och var mellan 18 och 84 år, samt hade varit folkbokförda i Sverige i minst fem år. I januari 2023 fanns enligt Registret över totalbefolkningen 7 748 889 personer som uppfyllde dessa villkor. I samarbete med Statistikmyndigheten (SCB) skickades enkäten till 235 900 personer och 88 725 av de besvarades. Svarsfrekvensen blev 38%, varierade från 36 till 39 procent mellan de olika områdena. Högst svarsfrekvens hade Övriga Sverige (39,1 procent) och Västra Götaland (38,8 procent medan Skåne (36 procent) och Stockholm (36,8 procent) hade lägst svarsfrekvens. (Tabell 1).

Luftföroreningar

Tabell 1: Tid i trafiken. Tid i trafiken till och från arbete, skolan eller fritidsaktiviteter

	Tid i trafiken		
	≥1 timme	30-60 minuter	<30 minuter
Stockholms län	47	31	22
Västra Götaland	36	33	31
Skåne	37	31	32
Övriga Sverige	30	33	37
Sverige	36	32	32

Eftersom de högsta halterna av luftföroreningar förekommer i gaturum är tiden för vistelse i trafikerade miljöer avgörande för graden av exponering för luftföroreningar, oavsett om en person åker bil, går, cyklar eller färdas på annat sätt. Resultaten visar att andelen som befinner sig i trafiken mer än en timme varje dag bor i storstadsregionerna, särskilt i Stockholms län. Enligt MHE 23 rapporterar hälften (47 procent) av befolkningen i Stockholms län att de varje dag vistas mer än en timme i trafik.

Tabell 2: Bostäder i trafikutsatt läge. Andel (procent) av befolkningen som bor i en bostad med fönster som vetter mot en större gata eller trafikled, uppdelad på flerbostadshus och småhus. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Något fönster			Sovrumsfönster		
	Flerbostads- hus	Småhus	Totalt	Flerbostads- hus	Småhus	Totalt
Stockholms storstad	25	11	23	15	6,8	13
Göteborgs stad	25	11	21	16	6,8	14
Malmö stad	29	10	25	17	5,4	14
Stockholms län	24	9,6	19	14	5,3	11
Västra Götaland	25	11	17	15	5,0	9,4
Skåne	27	13	19	15	6,8	10
Övriga Sverige	26	12	17	15	5,6	8,9
Sverige	25	11	18	15	5,6	9,7

Förutom tiden som en person vistas i trafikerade miljöer har bostadens, arbetsplatsens och

skolans läge relativt stor betydelse för graden av exponering för luftföroreningar i utomhusluften. Om bostaden eller arbetsplatsen ligger nära en gata med mycket trafik blir halten av luftföroreningar förhöjd även inomhus. Tidigare studier har visat att luftföroreningar som genereras av vägtrafiken tränger in i närliggande byggnader, s.k. trafikutsatta bostäder. Tabellen visar andelen hushåll som har fönster eller sovrumsfönster mot trafikutsatta miljöer, uppdelat på flerbostadshus och småhus i olika geografiska områden. Resultaten visar att flerbostadshus är mer utsatta än småhus. Vid jämförelse mellan storstäder, regioner eller övriga Sverige visar resultaten att det förekommer små eller inga skillnader avseende trafikutsatta bostäder.

Tabell 3: Förekomst av vedeldning. Andel av befolkningen som har en granne som eldar med ved inom 200 m från bostaden. Uppdelat på storstadsregioner, övriga Sverige och Sverige.

	Vedeldning inom 200 m
<i>Stockholms län</i>	31
<i>Västra Götaland</i>	40
<i>Skåne</i>	39
<i>Övriga Sverige</i>	47
<i>Sverige</i>	41

Småskalig vedeldning är relativt vanligt i Sverige, främst i radhus- och villaområden, och utgör en betydande källa till exponering för hälsoskadliga luftföroreningar. Vid förbränning av ved och andra fasta bränslen i mindre eldstäder utan rökgasrening avges sot, inandningsbara partiklar, flyktiga organiska kolväten, polyaromatiska kolväten samt kvävedioxid och aldehyder till omgivningsluften. Enligt MHE 23 är andelen hushåll som har en granne som eldar med ved inom 200 m från bostaden är lägst i storstadsregionerna, särskilt i Stockholms län (31 procent) jämfört med övriga Sverige (47 procent).

Tabell 4: Upplevelse av luftkvalitet. Andel (procent) av befolkningen som uppger att luftkvaliteten är Mycket bra/bra, Acceptabel eller Ganska dålig/mycket dålig utanför bostaden. Uppdelat på storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregion (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Mycket bra/ ganska bra	Acceptabel	Ganska dålig/ mycket dålig
<i>Stockholms storstad</i>	68	22	10
<i>Göteborgs stad</i>	75	18	7,8
<i>Malmö stad</i>	68	21	10
<i>Stockholms län</i>	76	17	7,0
<i>Västra Götaland</i>	84	12	4,5
<i>Skåne</i>	82	13	5,0
<i>Övriga Sverige</i>	86	11	3,1
<i>Sverige</i>	83	13	4,4

Förutom att orsaka, bidra till eller förvärra sjukdomar kan luftföroreningar även ge upphov till en rad olika störningar, som till exempel besvär av lukter och upplevd dålig luftkvalitet. Resultat från MHE 23 visar att de flesta (över 90 procent) av Sveriges befolkning uppger att luftkvaliteten utanför bostaden är mycket bra, bra eller acceptabel. En viss andel (4,4 procent) rapporterar att luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig. Jämfört med övriga Sverige visar resultaten att andelen som uppger att luftkvaliteten är dålig eller mycket dålig är dubbelt så hög i storstadsregionerna och tre gånger så hög i storstäderna.

Tabell 5: Upplevelse av luftkvalitet och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som uppger att luftkvaliteten är ganska dålig/mycket dålig utanför bostaden över tid (2007, 2015 och 2023). Uppdelat på storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregion (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Ganska dålig/ mycket dålig		
	2007	2015	2023
<i>Stockholms storstad</i>	15	12	10
<i>Göteborgs stad</i>	11	7,4	7,8
<i>Malmö stad</i>	11	8,5	10
<i>Stockholms län</i>	8,4	7,3	7,0
<i>Västra Götaland</i>	5,5	4,2	4,5
<i>Skåne</i>	5,5	4,3	5,0
<i>Övriga Sverige</i>	3,1	3,3	3,1
<i>Sverige</i>	4,9	4,5	4,4

Resultaten visar att, i jämförelse med undersökningarna från 2007 och 2015, en betydlig förbättring. Andelen som rapporterar att luftkvaliteten är ganska dålig/mycket dålig utanför bostaden har minskat mellan åren 2007 och 2023, främst i Stockholms och Göteborgs stad.

Tabell 6: Besvär av bilavgaser i och i närheten av bostaden. Andel (procent) av befolkningen som besväras av bilavgaser, minst en gång per vecka, i och i närheten av bostaden. Uppdelat på storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregion (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

<i>Stockholms storstad</i>	10
<i>Göteborgs stad</i>	10
<i>Malmö stad</i>	11
<i>Stockholms län</i>	8,2
<i>Västra Götaland</i>	6,5
<i>Skåne</i>	6,3
<i>Övriga Sverige</i>	4,8
<i>Sverige</i>	6,0

Den enskilt största orsaken till besvär av luftföroreningar i och i närheten av bostaden (till exempel på balkong, innergård, trädgård eller vid entrén) är avgaser från vägtrafiken.

Resultaten visar att andelen som besväras av bilavgaser, minst en gång per vecka, i och i närheten av bostaden är betydligt högre i storstäderna jämfört med storstadsregioner Övriga Sverige och Sverige totalt.

Tabell 7: Besvär av bilavgaser och bostadens läge. Andel (procent) av befolkningen som besväras av bilavgaser, dagligen, uppdelat på om bostaden har fönster mot en större gata eller trafikled.

	Inget fönster mot större gata/trafikled	Fönster mot större gata/trafikled
<i>Stockholms län</i>	2,4	11
<i>Västra Götaland</i>	2,0	9,9
<i>Skåne</i>	2,1	10
<i>Övriga Sverige</i>	1,1	7,0
<i>Sverige</i>	1,7	8,8

Resultaten visar att andelen som dagligen besväras av bilavgaser är betydligt högre (4-5 gånger högre) bland de som bor i en bostad med fönster som vetter mot en större gata eller trafikled än de som inte har ett fönster mot trafikerat läge.

Buller

Tabell 1: Bullerutsatt bostad. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de har något bostadsfönster respektive sovrumsfönster mot bullerutsatt sida (större gata/trafikled, järnväg eller industri). Uppdelat dels på bostadstyp (Flerbostadshus och småhus), dels uppdelat på storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregion (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Något fönster			Sovrumsfönster		
	Flerbostads-hus	Småhus	Totalt	Flerbostads-hus	Småhus	Totalt
Stockholms storstad	30	14	27	18	8,5	17
Göteborgs stad	27	11	23	17	6,9	15
Malmö stad	31	13	27	19	8,0	16
Stockholms län	29	12	23	18	7,2	14
Västra Götalands	29	15	21	18	8,0	12
Skåne	31	18	23	18	10	14
Övriga Sverige	31	17	22	18	8,9	12
Sverige	30	16	22	18	8,6	13

Resultaten visar att andelen som har något bostadsfönster respektive sovrumsfönster mot bullerutsatt sida är mycket högre bland de som bor i flerbostadshus jämfört med de som bor i småhus, dessutom är andelen något högre i storstäderna jämfört med storstadsregionerna, övriga Sverige och Sverige totalt

Tabell 2: Lyssnar på musik med hög volym. Andel (procent) av befolkningen som dagligen lyssnar på musik med hög volym, uppdelat på kön och ålder. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Kvinnor			Män		
	18–39 år	40–59 år	60–84 år	18–39 år	40–59 år	60–84 år
<i>Stockholms län</i>	20	6,7	2,0	22	7,0	2,8
<i>Västra Götalands</i>	20	4,1	1,4	18	5,5	1,5
<i>Skåne</i>	22	6,0	2,1	23	5,1	2,1
<i>Övriga Sverige</i>	15	4,4	1,9	17	6,1	1,8
<i>Sverige</i>	18	5,1	1,9	19	6,1	2,0

Resultaten visar att störst andel finns bland unga (18–39 år) där cirka var femte person dagligen lyssnar på musik med hög volym. Andelen är något högre bland de som bor i storstadsregioner, jämfört med övriga Sverige.

Tabell 3: Störs mycket eller väldigt mycket av trafikbuller. Andel (procent) av befolkningen som störs mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, uppdelat på flerbostadshus och småhus. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Flerbostadshus	Småhus	Totalt
<i>Stockholms storstad</i>	13	12	13
<i>Göteborgs stad</i>	8,3	3,5	7,4
<i>Malmö stad</i>	13	5,8	11
<i>Stockholms län</i>	12	7,8	10
<i>Västra Götaland</i>	8,3	5,3	6,9
<i>Skåne</i>	11	5,9	8,0
<i>Övriga Sverige</i>	9,0	4,6	6,4
<i>Sverige</i>	10	5,4	7,6

Den vanligaste orsaken till bullerstörning är trafiken. Resultaten visar att störst andel, som störs mycket eller väldigt mycket av buller från väg-, spår- eller flygtrafik, finns bland de som bor i Stockholms storstad och Malmö stad samt Stockholms län och Skåne jämfört med övriga landet.

Tabell 4: Tidstrender i störning av bullerbuller. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län och i Sverige totalt som störs mycket eller väldigt mycket av olika bullerkällor, år 2007, 2015 respektive 2023

	Stockholms län			Sverige		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023
<i>Grannbuller</i>	7,4	7,2	7,5	5,4	5,5	5,7
<i>Vägtrafikbuller</i>	9,6	8,1	7,2	8,3	6,4	6,1
<i>Tågtrafikbuller</i>	2,0	1,8	1,8	1,7	1,5	1,4
<i>Flygtrafikbuller</i>	4,0	3,3	3,5	1,6	1,2	1,4
<i>Industribuller</i>	0,5	0,4	0,7	0,6	0,3	0,6
<i>Fläktbuller</i>	3,1	2,4	2,9	2,1	1,8	2,2
<i>Hissbuller</i>	1,9	1,3	1,4	1,0	0,7	0,9
<i>Nöjesbuller</i>	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
<i>Byggbuller</i>	4,2	4,3	5,9	2,3	2,3	3,7
<i>Renhållningsbuller</i>	4,1	3,8	4,2	2,4	2,2	2,6
<i>Hamnbuller</i>		0,2	0,2		0,1	0,2
<i>Vindkraftsbuller</i>		0,3	0,8		0,3	0,7

Resultaten visar att av de olika bullerkällor är det trafikbuller, främst vägtrafikbuller som orsakar högst andel störda både i Stockholms län och i Sverige. Denna andel visar en tendens att minska jämfört med år 2015 och 2007

Tabell 5: Besvär av trafikbuller vid olika aktiviteter. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen eller varje vecka året runt besväras av trafikbuller vid olika aktiviteter. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Svårt att höra radio/TV	Svårt att föra samtal	Störs vid vila eller avkoppling	Störd sömn*	Svårt att ha fönster öppet dagtid	Svårt att sova med öppet fönster	Svårt att vistas på balkong eller uteplats
<i>Stockholms storstad</i>	3,2	1,6	5,9	6,3	9,0	10,7	4,2
<i>Göteborgs stad</i>	2,2	0,9	2,1	5,5	6,2	8,3	2,7
<i>Malmö stad</i>	2,6	0,9	6,5	6,7	7,3	9,5	2,1
<i>Stockholms län</i>	2,4	1,4	4,3	5,2	6,6	8,1	3,3
<i>Västra Götaland</i>	1,4	0,8	2,8	4,5	3,9	5,8	1,9
<i>Skåne</i>	1,5	0,8	4,2	4,8	4,9	6,0	2,2
<i>Övriga Sverige</i>	1,5	0,9	2,7	3,6	3,3	4,5	1,5
<i>Sverige</i>	1,7	1,0	3,3	4,3	4,3	5,7	2,1

Resultaten visar att, jämfört med övriga Sverige, är andelen som besväras vid olika aktiviteter av de olika bullerkällor är högre bland de som bor i storstadsregion och ännu högre bland de som bor i storstäderna.

Inomhusmiljö

Tabell 1: Fukt och mögel, tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som anger minst ett av alternativen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i bostaden uppdelat på boendeform (småhus, bostadsrätt, hyresrätt och totalt). Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Småhus			Bostadsrätt			Hyresrätt			Totalt		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms storstad	16	25	22	12	12	12	22	25	20	17	19	16
Göteborgs stad	21	25	16	14	10	11	25	29	25	21	23	18
Malmö stad	11	13	15	6,7	12	13	27	21	19	16	16	15
Stockholms län	19	22	17	11	12	11	21	25	20	17	19	16
Västra Götaland	21	20	17	11	12	11	21	27	21	20	21	17
Skåne	16	21	18	10	14	13	23	22	17	17	20	17
Övriga Sverige	20	20	17	8,2	9,1	6,9	18	22	18	18	19	16
Sverige	20	20	17	9,9	11	9,9	20	24	19	18	20	16

Synlig fuktskada, mögellukt och synlig mögelväxt, enskilt eller i kombination, används som indikatorer på exponering för fukt och mögel och därmed en potentiellt mer ohälsosam inomhusmiljö. Högre andel fukt och mögel uppges bland de som bor i hyresrätt och småhus jämfört med de som bor i bostadsrätt. Små eller inga skillnader sågs vid jämförelse mellan olika geografiska områden. Sedan den förra undersökningen 2015 (MHE 15) har rapporteringen av fukt och mögel minskat något.

Tabell 2: Inomhusmiljörelaterade besvär och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som anger att de har ögon- näs- eller luftvägsproblem (minst en gång per vecka) av inomhusmiljön i bostaden eller på arbetet/i skolan. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Bostad						Arbete/skola					
	2007		2015		2023		2007		2015		2023	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
<i>Stockholms storstad</i>	6,8	4,6	10	6,6	12	7,9	8,2	4,6	12	6,2	11	5,8
<i>Göteborgs stad</i>	5,6	5,4	10	5,9	12	7,5	7,6	3,9	8,2	4,7	11	4,3
<i>Malmö stad</i>	8,0	6,6	10	5,1	13	8,7	9,4	7,8	10	5,7	11	11
<i>Stockholms län</i>	6,0	4,7	9,4	6,0	11	6,9	6,8	4,3	9,7	5,2	11	5,5
<i>Västra Götaland</i>	5,1	3,2	7,3	5,1	9,6	5,9	7,1	3,7	5,8	5,4	9,8	3,9
<i>Skåne</i>	6,6	5,0	8,0	5,8	9,6	5,0	7,5	5,1	6,1	4,7	9,9	4,0
<i>Övriga Sverige</i>	5,4	3,4	6,6	4,0	8,8	5,1	6,2	4,5	6,7	3,4	9,7	4,6
<i>Sverige</i>	5,6	3,8	7,5	4,8	9,6	5,6	6,7	4,4	7,1	4,3	10	4,6

Resultaten visar att andel (procent) av befolkningen som anger att de får ögon- näs- eller luftvägsproblem (minst en gång per vecka) av inomhusmiljön i bostaden eller på arbetet/i skolan är högre bland de som bor i storstadsregioner jämfört med övriga Sverige. Kvinnor rapporterar i högre utsträckning än män. För både män och kvinnor har rapporteringen av besvär i relation till bostaden ökat sedan 2007.

Tabell 3: Luftkvalitet inomhus, boendeform och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som anger dålig luftkvalitet i bostaden uppdelat på boendeform och tidstrender. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Småhus			Bostadsrätt			Hyresrätt			Totalt		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	1,2	1,2	2,5	5,0	3,8	6,4	11	9,7	13	5,3	4,6	6,8
Västra Götaland	0,9	1,1	1,5	3,7	3,1	3,8	8,5	9,9	11	3,6	3,9	4,4
Skåne	1,6	1,2	2,0	-	-	4,8	6,5	6,1	9,6	3,1	2,4	4,3
Övriga Sverige	0,6	1,4	1,7	3,3	2,2	3,6	7,2	8,2	9,3	2,6	3,2	3,7
Sverige	0,9	1,3	1,8	4,0	2,8	4,9	8,2	8,6	11	3,4	3,5	4,6

Resultaten visar att andel som rapporterar dålig luftkvalitet inomhus varierar beroende på boendeformen. Högst andel rapporteras bland de som bor i flerfamiljs hus, främst bland de som bor i hyreslägenhet, jämfört med de som bor i småhus (en familjs hus). Andelen som rapporterar dålig luftkvalitet inomhus är högre bland de som bor i storstadsregionerna, främst i Stockholms län, jämfört med övriga landet. Rapporteringen av dålig luftkvalitet i bostaden har dessutom ökat över tid.

Klimatförändringar

Tabell 1: Möjlighet att reglera temperaturen. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de ofta (≥ 1 gång/vecka) besväras av att det är för varmt i bostaden under sommarhalvåret för kallt under vinterhalvåret. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	För varmt under sommarhalvåret				För kallt under vinterhalvåret			
	Småhus	Bostadsrätt	Hyresrätt	Totalt	Småhus	Bostadsrätt	Hyresrätt	Totalt
Stockholms län	33	39	42	37	25	26	41	29
Västra Götaland	27	31	42	30	19	24	36	25
Skåne	28	35	36	31	20	20	34	23
Övriga Sverige	26	36	41	31	17	16	34	21
Sverige	27	36	41	32	19	22	36	24

Resultaten visar att andel som rapporterar att de besväras minst en gång per vecka för att det är för varmt under sommarhalvåret respektive kallt under vinterhalvåret är högst bland de som bor i hyreslägenhet och lägst bland de som bo i småhus (en familj hus). Andelen var något högre bland de som bor i Stockholms län jämfört med övriga regioner.

Tabell 2: Möjlighet att reglera temperaturen under sommarhalvåret och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de ofta (≥ 1 gång/vecka) besvärar sig av att det är för varmt i bostaden under sommarhalvåret och tidstrender. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	För varmt under sommarhalvåret							
	2015				2023			
	Småhus	Bostadsrätt	Hyresrätt	Totalt	Småhus	Bostadsrätt	Hyresrätt	Totalt
Stockholms storstad	15	23	32	25	34	39	43	40
Göteborgs stad	14	19	30	23	24	32	40	33
Malmö stad	19	21	28	23	32	37	38	36
Stockholms län	14	22	32	22	33	39	42	37
Västra Götalands län	12	18	30	18	27	31	42	30
Skåne län	13	22	28	18	28	35	36	31
Övriga Sverige	15	23	32	25	26	36	41	31
Sverige	14	19	30	23	27	36	41	32

Resultaten visar att andel som rapporterar att de besvärar sig minst en gång per vecka för att det är för varmt under sommarhalvåret har ökat över tid, oavsett om man bor i en storstadsregion eller i övriga Sverige. Problemet med höga temperaturer verkar alltså blivit vanligare.

Tabell 3: Klimatoro och möjligheten att påverka framtiden. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de "alltid eller ofta", oroar sig över klimatet, medvetet minskar sitt klimatavtryck och känner sig hoppfulla om att klimatförändringen kan bromsas Uppdelat mellan män och kvinnor. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Oroar sig över klimatet		Medvetet minskar sitt klimatavtryck		Känner sig hoppfulla om att klimatförändringen kan bromsas	
	Kvinna	Man	Kvinna	Man	Kvinna	Man
<i>Stockholms storstad</i>	47	32	58	47	13	19
<i>Göteborgs stad</i>	39	29	58	42	11	18
<i>Malmö stad</i>	39	29	52	47	11	20
<i>Stockholms län</i>	43	28	56	45	14	19
<i>Västra Götalands län</i>	37	24	53	39	12	20
<i>Skåne län</i>	37	23	51	41	13	18
<i>Övriga Sverige</i>	35	21	50	38	12	16
<i>Sverige</i>	38	24	52	40	12	18

Resultaten visar att kvinnor oroar sig över klimatet och medvetet minskar sitt klimatavtryck i större utsträckning än män samtidigt som de känner sig i lägre andel än män hoppfulla om att klimatförändringen kommer att bromsas. Andelen som oroar sig över klimatet och medvetet minskar sitt klimatavtryck, oavsett om det är kvinnor eller män, är högst bland de som bor i storstäderna följt därefter av de som bor i storstadsregion och längst bland de som bor i övriga Sverige.

Naturmiljöer, urbanisering och fysisk aktivitet

Tabell 1: Vistelse i grönområden och ursprungsland. Andel (procent) av befolkningen som anger att de vistas i grönområden ”sällan” (mindre än en gång per månad eller några gånger per år uppdelat på födelseland. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Födelseland			
	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga Världen
<i>Stockholms storstad</i>	6,3	8,1	9,1	19
<i>Göteborgs stad</i>	6,1	9,2	14	15
<i>Malmö stad</i>	8,7	17	9,1	22
<i>Stockholms län</i>	7,7	11	11	21
<i>Västra Götalands län</i>	6,7	11	12	21
<i>Skåne län</i>	10	14	12	22
<i>Övriga Sverige</i>	8,9	11	11	23
<i>Sverige</i>	8,5	12	11	22

Resultaten visar stora skillnader om andel av befolkningen som sällan (mindre än en gång per månad) besöker ett grönområde uppdelat på födelseland oavsett om de bor i storstad, storstadsregion eller övriga Sverige. Andelen är högst bland de som är födda i ett land utanför Europa (22 procent). Motsvarande andel bland de som är födda i Sverige, och övriga Europa är endast 8 respektive 11 procent.

UV-strålning

Tabell 1: Solarieanvändning och tidstrender. Andel kvinnor respektive män i olika åldrar som rapporterat att de har solat solarium det senaste året och tidstrender (2007, 2015 och 2023). Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Kvinnor								
	18–39 år			40–59 år			60–84 år*		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	27	16	8,4	14	6,6	5,3	3,4	2,1	1,6
Västra Götaland	38	19	8,9	19	13	7,0	8,8	3,8	1,6
Skåne	38	21	12	18	11	7,6	2,9	3,3	2,1
Övriga Sverige	38	18	9,0	21	11	6,0	4,1	3,3	1,4
Sverige	35	18	9,2	19	10	6,2	4,6	3,2	1,6

*60-80 år för 2007

	Män								
	18–39 år			40–59 år			60–84 år*		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	18	11	4,7	7,0	5,2	4,3	1,5	1,4	1,4
Västra Götaland	22	7,1	3,8	6,7	6,0	4,2	2,8	2,2	1,8
Skåne	25	13	6,3	8,0	2,8	2,0	3,5	0,9	1,3
Övriga Sverige	20	12	4,3	6,6	4,4	3,7	2,2	1,6	0,9
Sverige	20	11	4,6	6,9	4,6	3,7	2,3	1,6	1,2

*60-80 år för 2007

Resultaten visar att kvinnor, främst de unga mellan 18–39 år, rapporterar i ett större andel än män att de solar solarium. Andelen har dock minskat över tid hos både män och kvinnor oavsett ålder eller geografiskt område.

Tabell 2: Användning av solskydd. Andel (procent) av befolkningen som anger att de ofta eller alltid använder olika metoder för att skydda sig mot solen i Sverige, uppdelat på kön. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Med hjälp av kläder		Med hjälp av solskyddskläder		Vistas i skuggan		Solskyddskräm	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Stockholms län	56	62	13	10	48	42	68	41
Västra Götaland	54	65	10	9,7	46	43	66	42
Skåne	54	62	13	11	48	43	69	46
Övriga Sverige	51	60	10	8,4	46	40	63	37
Sverige	53	62	11	9,3	47	41	66	40

Resultaten visar att kvinnor skyddar sig mot solen med hjälp av solskyddskräm i ett större andel än män. Män, däremot, skyddar sig mot solen i ett större andel än kvinnor med hjälp av kläder.

Tabell 3: Användning av solskydd och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som anger att de ofta eller alltid använder olika metoder för att skydda sig mot solen i Sverige. Jämförelse mellan storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Med hjälp av kläder			Vistas i skuggan			Solskyddskräm		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	56	62	13	10	48	42	68	41	56
Västra Götaland	54	65	10	9,7	46	43	66	42	54
Skåne	54	62	13	11	48	43	69	46	54
Övriga Sverige	51	60	10	8,4	46	40	63	37	51
Sverige	53	62	11	9,3	47	41	66	40	53

Resultaten visar att andelen skyddar sig mot solen med hjälp av kläder har minskat över tid. Att skydda sig mot solen genom att vistas i skuggan eller med hjälp av solskyddskräm har ökat under perioden 2007 till 2023. Det finns små eller inga regionala skillnader om användning av solskydd och tidstrender.

Kemikalier

Tabell 1: Dricksvattenförsörjning i Sverige. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de dricker kommunalt dricksvatten, dricksvatten från egen brunn eller från gemensam brunn eller att de inte dricker kranvatten. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Kommunalt vatten	Egen brunn	Gemensam brunn	Dricker inte kranvatten
Stockholms län	94	4,0	1,2	1,2
Västra Götaland	86	12	0,8	1,3
Skåne	91	6,1	1,1	2,1
Övriga Sverige	84	13	2,2	1,0
Sverige	87	9,9	1,6	1,3

Resultaten visar att de allra flesta (87 procent) dricker kommunalt vatten, en mindre andel (12 procent) dricker vatten från egna brunnar eller gemmansamma brunnar och några få (1-2 procent) inte dricker kranvatten. Vid jämförelse mellan olika regioner visar resultaten att andelen som dricker kommunalt vatten är högst bland de som bor i Stockholms län och i Skåne.

Tabell 2: Dricksvattenkvalitet i enskild vattenförsörjning. Rapporterade analyssvar av dricksvattenkvalitet hos befolkningen som har egen vattenförsörjning och har analyserat sitt dricksvatten någon gång under de senaste tre åren. Andel (procent) av rapporterade analyssvar som visade tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt vatten. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Tjänligt	Tjänligt med anmärkning	Otjänligt	Vet inte
<i>Stockholms län</i>	73	20	1,5	5,6
<i>Västra Götaland</i>	75	17	2,2	6,0
<i>Skåne</i>	71	24	1,0	4,3
<i>Övriga Sverige</i>	75	21	0,5	2,8
<i>Sverige</i>	75	20	1,0	3,9

Resultaten visar att de allra flesta (75 procent) som dricker vatten från egen brunn rapporterar att deras brunn har tjänligt vatten, 20 procent har tjänligt vatten med anmärkning, medan endast 1 procent har otjänligt vatten. Vid jämförelse mellan olika regioner visar resultaten att det förekommer små eller inga skillnader i dricksvattenkvalitet från egen brunn.

Tabell 3: Köp av ekologiska livsmedel och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som uppger att de, i stor utsträckning, handlar ekologiska livsmedel. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	2007	2015	2023
<i>Stockholms län</i>	18	33	31
<i>Västra Götaland</i>	15	30	28
<i>Skåne</i>	15	23	26
<i>Övriga Sverige</i>	14	28	26
<i>Sverige</i>	15	29	28

Resultaten visar att andelen av befolkningen som handlar ekologiska livsmedel ligger kvar på ungefär samma nivå som 2015, efter en tidigare ökning från 2007.

Tabell 4: Fiskkonsumtion, förändring över tid. Andel (procent) som konsumerar fisk 2 gånger i veckan eller mer, samt konsumtion av insjöfisk eller strömming fångad i Östersjön 4 gånger per år eller mer. Uppdelat på 2015 och 2023. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Fisk totalt ≥ 2 gånger per vecka		Insjöfisk ≥ 4 gånger per år		Strömming/sill ≥ 4 gånger per år	
	2015	2023	2015	2023	2015	2023
Stockholms län	32	22	30	15	37	19
Västra Götaland	27	20	20	8,5	27	14
Skåne	24	16	21	10	36	22
Övriga Sverige	23	17	27	14	35	20
Sverige	26	18	26	13	34	19

Resultaten visar att andelen av befolkningen som äter fisk 2 eller flera gånger per vecka har minskat från 26 till 18 procent mellan 2015 och 2023. Dessutom har andelen som äter insjöfisk eller strömming fångad i Östersjön 4 gånger per år eller mer har halverats mellan 2015 och 2023. Den minskade fiskkonsumtionen är detsamma oavsett om man bor i storstadsregion eller övriga Sverige.

Tabell 5: Fiskkonsumtion hos kvinnor i fertil ålder, förändring över tid. Andel (procent) kvinnor i fertil ålder som konsumerar fisk 2 gånger i veckan eller mer, samt konsumtion av insjöfisk eller strömming fångad i Östersjön 4 gånger per år eller mer. Uppdelat på 2015 och 2023. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Fisk totalt ≥ 2 gånger per vecka		Insjöfisk ≥ 4 gånger per år		Strömming/sill ≥ 4 gånger per år	
	2015	2023	2015	2023	2015	2023
Stockholms län	26	16	21	9,2	21	8,6
Västra Götaland	23	14	15	5,5	16	4,5
Skåne	20	11	12	6,1	18	7,1
Övriga Sverige	19	12	21	8,8	16	6,1
Sverige	21	13	19	8,0	17	6,6

Resultaten visar att andelen av kvinnor i fertil ålder som äter fisk 2 eller flera gånger per vecka har minskat från 21 till 13 procent mellan 2015 och 2023. Dessutom har andelen som äter insjöfisk eller strömming fångad i Östersjön 4 gånger per år eller mer har minskat 2-3 gånger mellan 2015 och 2023. Den minskade fiskkonsumtionen är detsamma oavsett om man bor i storstadsregion eller övriga Sverige.

Tabell 6A: Överkänslighet och allergi mot produkter och material. Andel (procent) av befolkningen som anger att de är känsliga, överkänsliga eller allergiska mot nya kläder/textilier, rengöringsprodukter, plast/gummi/latexhandskar eller bygg/hobbyprodukter som kommer i kontakt med huden, uppdelat på kön. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Nya kläder och andra textilier (hudreaktioner)		Rengörings-, tvätt- och diskmedel		Plast-, gummi- och latexhandskar		Nybyggda eller nyrenoverade byggnader, bygg- och hobbyprodukter (t.ex. målarfärg, lim, rengöringsmedel)	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Stockholms län	10	4,6	17	8,3	6,8	2,5	8,9	4,0
Västra Götaland	11	4,8	17	7,3	7,0	1,6	8,4	4,4
Skåne	10	4,4	16	7,8	8,1	2,0	8,5	3,1
Övriga Sverige	9,4	4,1	16	7,1	6,7	2,1	7,9	4,4
Sverige	9,9	4,4	16	7,5	7,0	2,1	8,3	4,1

Tabell 6B: Överkänslighet och allergi mot produkter och material. Andel (procent) av befolkningen som anger att de är känsliga, överkänsliga eller allergiska mot permanent eller tillfällig tatuering, nickel eller hårfärgningsmedel som kommer i kontakt med huden, uppdelat på kön. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Permanent tatuering		Tillfällig tatuering (henna)		Nickel		Hårfärgningsmedel	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Stockholms län	5,1	4,0	4,4	3,5	26	4,7	9,3	5,2
Västra Götaland	5,2	6,1	4,9	2,2	27	4,4	8,9	9,0
Skåne	4,8	3,1	5,3	5,5	24	3,7	7,7	3,1
Övriga Sverige	4,9	4,0	5,2	1,5	26	4,7	7,5	4,9
Sverige	5,0	4,2	4,9	2,8	26	4,5	8,1	5,5

Resultaten från tabell 6A och 6B visar att en betydande andel rapporterar att de är överkänsliga eller allergiska mot olika vanliga konsumtionsartiklar som kommer i kontakt med huden. Fler kvinnor än män rapporterar problem med överkänslighet eller allergi mot dessa produkter. Överkänsligheten eller allergi mot produkter eller material är detsamma oavsett om man bor i storstadsregion eller övriga Sverige.

Miljötabaksrök

Tabell 1: Rökning och tidstrender. Andel (procent) rökare i befolkningen i Sverige och tidstrender. Jämförelse mellan kvinnor och män och uppdelat i daglig rökare, feströkare, före detta rökare och icke rökare

	1999		2007		2015		2023	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
<i>Daglig rökare</i>	22	15	15	13	9,6	8,4	6,1	5,4
<i>Fest rökare</i>	5,3	7	4,6	5,7	3,5	4,9	3,5	4,8
<i>Före detta rökare</i>	23	31	28	32	29	30	30	30
<i>Icke rökare</i>	49	47	53	50	58	56	60	59

Tabell 2: Rökning och utbildningsnivå. Andel (procent) rökare i befolkningen, uppdelat på utbildningsnivå. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Grundskola	Gymnasieskola	Högskola	Totalt
<i>Stockholms län</i>	10	6,9	2,5	5,5
<i>Västra Götaland</i>	6,9	7,0	2,9	5,6
<i>Skåne</i>	9,9	8,0	4,0	6,8
<i>Övriga Sverige</i>	9,0	5,9	2,5	5,5
<i>Sverige</i>	9,0	6,5	2,8	5,7

Resultaten visar att andelen dagligrökare i Sverige är 5,7 procent och att det är ingen nämnvärd skillnad mellan olika regioner (orstadsregioner och övriga Sverige). Däremot skiljer sig andelen rökare mellan utbildningsnivåer. Hos personer med högskoleutbildning är andelen rökare knappt 3 procent (4 procent i Skåne), med gymnasienivå som högsta utbildning under 7 procent (8 procent i Skåne) och för de med grundskolenivå som högsta utbildning är andelen rökare mellan 7 och 10 procent

Tabell 3: Rökning, födelseland och kön. Andel (procent) rökare i befolkningen uppdelat på födelseland och kön. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Kvinnor				
	Sverige	Norden utanför Sverige	Europa utanför Norden	Världen utanför Europa	Totalt
<i>Stockholms län</i>	4,8	10	8,5	4,8	5,4
<i>Västra Götaland</i>	5,6	19	4,4	10	6,4
<i>Skåne</i>	7,1	8,6	9,4	4,2	7,2
<i>Övriga Sverige</i>	5,7	8,2	9,1	4,9	6,0
<i>Sverige</i>	5,7	11	8,3	5,7	6,1

	Män				
	Sverige	Norden utanför Sverige	Europa utanför Norden	Världen utanför Europa	Totalt
<i>Stockholms län</i>	3,9	8,6	10	10	5,7
<i>Västra Götaland</i>	3,4	13	15	11	4,9
<i>Skåne</i>	4,9	13	10	16	6,5
<i>Övriga Sverige</i>	4,1	11	9,4	11	5,0
<i>Sverige</i>	4,0	11	11	11	5,3

Resultaten visar stora skillnader i andel rökare och födelseland för både män och kvinnor. De lägsta andelen rökare finns bland de som är födda i Sverige och högst andel finns bland de födda utanför Norden och utanför Europa.

Tabell 4: Miljötabaksrök och utbildningsnivå. Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen utsattes för miljötabaksrök, uppdelat på utbildningsnivå. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Grundskola	Gymnasieskola	Högskola	Totalt
Stockholms län	4,1	3,4	1,4	2,7
Västra Götaland	4,2	2,5	1,0	2,3
Skåne	3,4	3,0	1,1	2,4
Övriga Sverige	3,9	2,1	0,9	2,2
Sverige	3,9	2,5	1,1	2,3

Resultaten visar att andelen vuxna som utsätts för daglig exponering av miljötabaksrök i bostaden, på arbetet, eller på annan plats är 2,3 procent och att det är ingen nämnvärd skillnad mellan olika regioner (orstadsregioner och övriga Sverige). Däremot skiljer sig andelen som utsätts för miljötabaksrök mellan utbildningsnivåer. Hos personer med högskoleutbildning är andelen ca 1 procent, med gymnasienivå som högsta utbildning ca 3 procent och för de med grundskolenivå som högsta utbildning är andelen ca 4 procent

Tabell 5: Miljötabaksrök och födelseland. Andel (procent) av befolkningen som dagligen utsattes för miljötabaksrök uppdelat på födelseland. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Sverige	Norden utanför Sverige	Europa utanför Norden	Världen utanför Europa
Stockholms län	1,8	1,8	4,4	5,8
Västra Götaland	1,7	2,2	3,1	7,0
Skåne	1,6	0	4,2	7,1
Övriga Sverige	1,5	2,9	3,9	7,5
Sverige	1,6	2,1	4,0	6,8

På liknande vis med de tidigare resultaten skiljer sig andelarna mellan födelseländer. De som är födda i världen utanför Europa, och även i Europa utanför Norden, utsätts oftare för andras tobaksrök, jämfört med de som är födda i Sverige, eller Norden utanför Sverige. Vid jämförelse mellan olika regioner visar resultaten att det förekommer små eller inga skillnader.

Tabell 6: Miljötobaksrök, födelseland och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen i Sverige som dagligen utsätts för miljötobaksrök uppdelad på födelseland. Jämförelse mellan 2007, 2015 och 2023.

	2007	2015	2023
<i>Sverige</i>	6,2	2,3	1,6
<i>Norden utanför Sverige</i>	9,6	2,3	2,1
<i>Europa utanför Norden</i>	12	8,3	4
<i>Världen utanför Europa</i>	15	9,4	6,8

Resultaten visar att exponering för miljötobaksrök har minskat över tid oavsett om man är född i Sverige eller i något annat land. Det minskade trenden är dock mycket långsammare bland de som är födda utanför Norden.

Tabell 7: Miljötobaksrök hos rökare, feströkare, före detta rökare, icke rökare och tidstrender. Andel procent av befolkningen i Sverige som dagligen utsätts för miljötobaksrök i bostaden, på arbetet eller på annan plats. Jämförelse mellan 1999, 2007, 2015 och 2023.

	1999	2007	2015	2023
<i>Daglig rökare</i>	28,0	19,1	12,2	12,3
<i>Feströkare</i>	15,0	7,9	4,5	3,7
<i>Före detta rökare</i>	7,5	4,6	2	1,8
<i>Icke rökare</i>	6,7	5,1	3,1	2,3
<i>Totalt</i>	11,0	7,0	3,1	2,3

Allergi och sjukdomar i luftvägarna

Tabell 1: Astmafrekomst i olika åldrar och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som rapporterar att de har astma, 2023 jämfört med 2015, uppdelat på åldersgrupp och totalt. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	18–39 år		40–59 år		60–84 år		Totalt	
	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023
Stockholms län	7,1	7,6	7,4	8,5	7,6	9,4	7,3	8,4
Västra Götaland	7,0	5,6	5,3	7,3	5,9	7,2	6,1	6,6
Skåne	6,0	6,2	5,6	7,7	8,0	6,5	6,4	6,8
Övriga Sverige	8,7	8,4	7,2	9,4	7,2	8,1	7,7	8,6
Sverige	7,6	7,4	6,7	8,6	7,1	8,0	7,2	8,0

Förekomsten av astma har ökat något över tid, främst hos de som är 40 år eller äldre. Resultaten visar små eller inga skillnader vid jämförelse mellan olika regioner i Sverige.

Tabell 2: Förekomst av allergisnuva och vasomotorisk i olika åldrar och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som rapporterar att de har allergisnuva eller vasomotorisk snuva i olika åldersgrupper och tidstrender. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Allergisnuva						Vasomotorisk snuva					
	18–39 år		40–59 år		60–84 år		18–39 år		40–59 år		60–84 år	
	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023	2015	2023
Stockholms län	31	30	29	32	19	23	19	18	19	19	17	19
Västra Götaland	27	31	30	34	13	20	20	19	19	17	17	18
Skåne	28	30	27	31	17	18	15	20	18	17	15	18
Övriga Sverige	27	29	27	31	16	18	16	19	17	19	17	15
Sverige	28	30	28	32	16	19	17	19	18	18	17	17

Resultaten visar små eller inga skillnader vid jämförelse mellan 2015 och 2023 inte heller när olika geografiska områden jämförs med varandra.

Tabell 3: allergiförekomst mot pollen, pälsdjur och kvalster och tidstrender. Andel (procent) av befolkningen som uppger att de är allergiska mot pollen, pälsdjur (katt, hund, häst eller gnagare) eller kvalster, 2023 jämfört med 2007 och 2015, uppdelat på kön. Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt

	Kvinnor								
	Pollen			Pälsdjur			Kvalster		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	30	35	45	19	22	22	11	12	19
Västra Götaland	24	30	41	15	16	21	11	9,9	20
Skåne	25	28	40	15	18	18	10	14	18
Övriga Sverige	25	31	39	18	19	21	9,5	9,9	18
Sverige	26	32	41	17	19	21	10	11	19

	Män								
	Pollen			Pälsdjur			Kvalster		
	2007	2015	2023	2007	2015	2023	2007	2015	2023
Stockholms län	29	34	41	18	22	22	8,0	8,6	11
Västra Götaland	26	33	39	15	20	20	9,7	10	9,7
Skåne	23	33	35	12	17	17	11	14	9,1
Övriga Sverige	24	28	36	15	17	20	7,8	7,3	9,7
Sverige	25	31	37	15	19	20	8,6	9,0	10

Resultaten visar att allergi mot pollen har ökat över tid från ca 25 procent år 2007 till ca 40 procent år 2023. Kvinnor rapporterar pollenallergi i något högre utsträckning än män men förekomsten har ökat hos båda könen. Även allergi mot kvalster har ökat något, främst hos kvinnor, mellan 2007 och 2023. Förekomst av pälsdjursallergi har däremot varit stabil mellan 2007 och 2023. Vid jämförelse mellan olika regioner visar resultaten att det förekommer små eller inga skillnader för vare sig pollen-, kvalster- eller pälsdjursallergi.

Jämlik miljöhälsa

Tabell 1: Jämlik miljöhälsa och multipla exponeringar. Andel (procent) av befolkningen som rapporterar hur mycket de exponeras för olika miljöfaktorer. Uppdelat på ursprungsland (Sverige eller utomlands). Jämförelse mellan storstadsregioner (Stockholms län, Västra Götaland och Skåne), övriga Sverige och Sverige totalt.

	Daglig vistelse i grönområde		Fönster mot trafikled		Bullerutsatt bostad		Trångbodd	
	Sverige	Utomlands	Sverige	Utomlands	Sverige	Utomlands	Sverige	Utomlands
Stockholms län	32	25	16	24	21	28	9,2	18
Västra Götaland	36	23	16	26	20	28	5,3	13
Skåne	34	26	16	29	21	33	4,1	17
Övriga Sverige	41	25	15	27	21	30	3,8	16
Sverige	37	25	16	26	21	30	5,2	16

Resultaten visar att det förekommer stora skillnader i landets befolkning just med avseende på individers bakgrund. Andelen som rapporterar att de bor trångt eller i en bostad som är utsatt för trafikbuller eller luftföroreningar, är högre bland de som är födda utanför Sverige jämfört med de som är födda i Sverige. Motsatsen gäller avseende daglig vistelse i grönområde. Den är högre bland de som är födda i Sverige jämfört med bland de som är födda utanför Sverige. Mönster, att utlandsfödda är mer trångbodda och bor i en större andel i en bostad som är utsatt för trafikbuller eller luftföroreningar än svenskfödda, ser likadant ut oavsett om man bor i en storstadsregion eller i övriga Sverige.